

Ana I, Woche 3 übung

28. Okt 2021

Blatt 1

Zu A4b lässt sich für $m \in \mathbb{N}$ beliebig vermuten, dass

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)\dots(k+m-1) = \frac{1}{m+1} n(n+1)\dots(n+m)$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. In der Tat lässt sich dies direkt zeigen (siehe rechts).

Für einen Beweis per Induktion:

IA: (trivial)

$$\begin{aligned} \text{ISchr.: } \sum_{k=1}^{n+1} k(k+1)\dots(k+m-1) &= \sum_{k=1}^n k(k+1)\dots(k+m-1) \\ &\quad + (n+1)\dots(n+m) \\ &\stackrel{\text{IV}}{=} \frac{1}{m+1} n(n+1)\dots(n+m) \\ &\quad + (n+1)\dots(n+m) \\ &= \frac{1}{m+1} (n+(m+1))(n+1)\dots(n+m) \\ &= \frac{1}{m+1} (n+1)\dots(n+1+m-1)(n+1+m) \\ &= \text{Formel für } n+1 // \end{aligned}$$

A4b (Herleitung der Formel ohne Ind.)
(0)

Sei $m \in \mathbb{N}$ beliebig.

Dann für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$\begin{aligned} &k(k+1)\dots(k+m-1) \\ &= (k+m-1)! / (k-1)! \\ &= m! \binom{m+k-1}{m} \end{aligned}$$

Erinnerung (Pascals Δ)

$$\forall r, n \in \mathbb{N}_0: \binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}$$

$$\Rightarrow \forall r, n \in \mathbb{N}_0: \binom{n-1}{r-1} = \binom{n}{r} - \binom{n-1}{r}$$

$$\Rightarrow \text{für } k \in \mathbb{N}_0 \text{ gilt } \binom{m+k-1}{m} = \binom{m+k}{m+1} - \binom{m+k-1}{m+1}$$

Also ist die Reihe für $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k(k+1)\dots(k+m-1) &= m! \sum_{k=1}^n \binom{m+k-1}{m} \\ &= m! \sum_{k=1}^n \binom{m+k}{m+1} - \binom{m+k-1}{m+1} \\ &= m! \left(\binom{m+n}{m+1} - \binom{m}{m+1} \right) \\ &= m! \frac{(m+n)!}{(m+1)!(n-1)!} = 0 \\ &= \frac{1}{m+1} n(n+1)\dots(n+m) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$